

Tonsilla palatina (amigdala)

- organo linfoide pari situato in fossa tonsillare
- forma anello di Waldeyer con tonsille: faringea, tubarica, laringea, linguale
- Forma di mandorla con asse maggiore: cranio caudale, antero posteriore di 2,5 cm

REGIONE	DESCRIZIONE
POLO SUPERIORE:	<ul style="list-style-type: none"> • angolo tra archi glossopalatino e faringopalatino
POLO INFERIORE:	<ul style="list-style-type: none"> • in rapporto con tonsilla linguale
FACCIA MEDIALE:	→ verso istmo delle fauci <ul style="list-style-type: none"> • presenza orifizi → cripte tonsillari • è ricoperta dalla piega triangolare <ul style="list-style-type: none"> ◦ forma tasca profonda o solco pretonsillare
MARGINE POSTERIORE:	→ forma solco retrotonsillare
FACCIA LATERALE	→ in fossa tonsillare rapporti da superficiale a profondo <ul style="list-style-type: none"> • spazio muscolo-fasciale: <ul style="list-style-type: none"> ◦ muscolo amigdaloglosso ◦ aponeurosi faringea ◦ muscolo costrittore superficiale faringe ◦ muscolo stiloglosso • spazio vasculonervoso: <ul style="list-style-type: none"> ◦ nervo glossofaringeo ◦ arteria palatina ascendente (ramo faciale) <ul style="list-style-type: none"> ▪ rilascia arteria tonsillare • spazio faringomandibolare, → zona prestiloidea <ul style="list-style-type: none"> ◦ muscolo pterigoideo interno ◦ mandibola • spazio faringomandibolare → zona retrostiloidea (2 cm più lateralmente) <ul style="list-style-type: none"> ◦ arteria carotide interna ◦ vena giugulare interna ◦ nervi (VAI): <ul style="list-style-type: none"> ▪ accessorio ▪ vago ▪ ipoglosso
ARTERIE	<ul style="list-style-type: none"> • arteria tonsillare (da arteria palatina ascendente) <ul style="list-style-type: none"> ◦ raggiunge faccia laterale organo ◦ perfora capsula
VENE:	<ul style="list-style-type: none"> • plesso tonsillare (a vena palatina ascendente)
LINFATICI:	<ul style="list-style-type: none"> • linfonodi cervicali giugulodigastrici • linfonodi dell'angolo mandibolare
NERVI:	<ul style="list-style-type: none"> • plesso tonsillare (nervi linguale e glossofaringeo)

FACCIA	TONACA	STRATO	CARATTERISTICHE
MEDIALE	MUCOSA	EPITELIO	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimentoso • stratificato • cheratinizzato → no nelle cripte • ricco di linfociti e granulociti
		LAMINA PROPRIA	<ul style="list-style-type: none"> • Cripte di Epitelio + lamina propria che penetrano nella sottomucosa • → non nelle cripte • totalmente occupata da linfoide e follicoli linfoidi secondari
	SOTTOMUCOSA		<ul style="list-style-type: none"> • LINFOIDE • CONNETTIVO → forma capsula tonsillare • vasi e nervi ghiandole salivari tonsillari • mucose pure
LATERALE	CAPSULA FIBROSA		separa da muscolo sottostante

